

# **DIGESTIVE DISEASES ASSOCIATES OF TAMPA BAY, LLC**

876 S. Parsons Ave, Brandon, Florida, 33511 • 813-653-3359 • Fax 813-662-9639

## **Instrucciones de preparación de EGD/ERCP**

### **Medicamentos**

El procedimiento al que está programado requerirá que suspenda ciertos medicamentos durante un período determinado antes de su procedimiento. Consulte la página 2 para obtener más instrucciones sobre los medicamentos anticoagulantes.

### **Pacientes diabéticos**

Si no recibió instrucciones previas sobre cómo proceder con su medicamento, comuníquese con nuestra oficina al 813-653-3359 Opción 7.

### **Instrucciones de preparación el día antes del procedimiento**

No tenga nada de comer o beber después de la medianoche, la noche antes de su procedimiento.

### **El día del procedimiento**

- Tome todos los medicamentos para la presión arterial, el corazón o las convulsiones con un poco de agua.
- No tome ningún medicamento para la diabetes a menos que su médico le indique lo contrario.
- **Haga arreglos para el transporte**, estará sedado y no podrá conducir ni irse a casa solo. Evite tomar un taxi/servicios de recogida a menos que esté acompañado por un adulto.

### **Cancelación o Reprogramación**

Si necesita cancelar o cambiar su procedimiento programado, comuníquese con nuestro Departamento de Programación de Procedimientos al 813-653-3359 Opción 3 con al menos 72 horas de anticipación.

### **Preguntas**

Si tiene alguna pregunta sobre su procedimiento o preparación, comuníquese con nuestro personal clínico al 813-653-3359, opción 7.

## **Instrucciones de preparación de EGD/ERCP**

### **Lista De Medicamentos Anticoagulantes**

Lea atentamente las instrucciones y las listas a continuación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina al 813-653-3359, opción 7.

#### **La lista de medicamentos que debe de dejar de tomar 5 días antes de su procedimiento:**

- Aspirina
- Ibuprofeno
- Advil
- Aleve
- Motrin
- Naproxeno
- Meloxicam
- Tolmetin
- Indometacina
- Sulindaco
- Piroxicam
- Diclofenaco
- Etodolac
- Advil Migraña
- Tylenol Migraña
- Excedrin Migraña
- Migraña Genérico
- Cualquier medicamento que contenga aspirina

Puede tomar Tylenol (acetaminofén)

#### **Siga estas instrucciones a menos que su proveedor le indique hacer lo contrario.**

- Coumadin: No tome 5 días antes de su procedimiento
- Pradaxa: No tome 2 días antes de su procedimiento
- Xarelto: No tome 1 día antes de su procedimiento

#### **No pare de tomar estos medicamentos a menos que se lo indique su proveedor.**

- Effient
- Plavix
- Brilinta